內政部登記證警字第一一二七號

本報特聘請吳之屛方家楨大律師爲常年法律顧問

長壽

于右任

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

第一一七期 每份四分

中華民國廿三年八月廿一日

每逢星期五出版 全年五十期連郵二元 國外加倍

館址 上海三馬路雲南路口幸福書局內

本期目錄

療妬新術
風流病之怪劇
冷飲爲胃痛之原因
水腫良方
婦人肛門產子
小兒傷食
孕婦與便秘
小兒吐嘔
夾陰腹痛急救法
活屋(十三)
肺癆貧血
溼溫轉瘧
溼溫證治
婦科雜談



療妬新術

(炳)

最近法國著名醫學家法雷醫學博士。聲稱能療治妬疾。願治療天下男女之患妬者。致轟動世界各國。一時報紙都有記載。目爲奇事。現巴黎晨報載有法雷醫學博士所述『療妬之原理』一文。頗堪發噱。歐西各報。均有轉載。因譯之如次。

法雷醫學博士稱妒爲人類之通病。而青年爲尤甚。驟視之妬似爲人性之常態。就生理上言之。則爲病症之一。亦可謂爲生理上天然之一缺點。非惟人類如是。即畜類亦未嘗不然。幼孩所有玩具。往往不讓他人玩弄。此足證人類初生時已有先天性之妒疾。惟妬疾亦隨人年齡而改變。青年時代。妬之表現在愛情。若己身所愛之人。爲他人所得。必妬火中燒。不惜以生命相搏。至老年則妬性漸退。與年俱衰。亦有生平無妬疾者。視世事皆甚平淡。但百人之中。難得其一也。

醫學界之研究妬病者。以德人琵兒博士爲前輩。博士初稱妬疾爲青春發育時期所必有之現象。與人頗之神經有關。後又自動打消其學說。以謂妬疾之輕重。直接關係於腺體發達之與否。彼曾檢查百入。中有八十人因腺體特別發達。而妬疾甚重。十人因腺體不甚發育。而妬症不顯著。所謂『腺體』。指脾藏之分泌及腆腺等內臟中物。琵兒博士又以爲女子之妬。更甚於男子。此殆由於生殖系統中分泌物關係。博士嘗在男女學生中。試驗其學說。謂女子涙腺特別發達。而善哭者。其妬疾亦必加甚云。

厥後又有各家學說。證明人類之妬疾。實則妬疾之由來。完全由於『內分泌』之發育。『內分泌』爲一神奇之腺體。已爲今日醫學上所公認。『內分泌』能使一老年人返老爲童。人之『內分泌』發育不全。將成爲一侏儒矮人。或發育不全之人。青春時期內之『內分泌』發達特甚。故妬亦最甚。老年人之『內分泌』腺體漸萎縮。故妬疾亦告衰退。內分泌腺爲人類生理上之剌戟主要物。固不可藥除。然由血液之中。使內分泌之效力。專向於生理上之剌戟。不使醸成妬疾。即可使妬疾之治療成功。今日世上甚多戀愛之悲劇。者由妬疾而來。如能一一加以診治。可免却不少慘案矣。

上海新新公司常年醫藥顧問
上海世界書局常年醫藥顧問
朱振聲 士

診例

(甲)門診一元 號金不取
(乙)出診四元 路遠遞加
(丙)賫丸方四元 隔日取件
(丁)外埠問病二元 原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間 門診上午九時至下午四時止 出診四時以後

電話 九一四九二

診所 上海路會樂里第一弄第一家

號 處 啓

溼溫轉瘧

魏長春

方慶財妻 年十八歲。六月間。患溼溫轉瘧。寒熱十日。截止。七月二十五日。寒熱又發。誤食水果雞鴨變劇。熱熾。發白瘖晶亮未隱。八月初四日。延余診治。見氣逆喘促。胸悶。欬嗽痰韌。便閉。溲少。神昏。譫語。沉眠。耳聾。頭汗。脈數。舌紅苔薄白。溼溫痰熱蒙閉。肺胃氣失清肅。胃熱冲腦神昏。痰火犯肺喘促。擬麻杏膏甘湯。佐竹瀝薑汁。清透肺胃熱痰。兼達溼溫伏邪。加紫雪丹五分。清熱開竅。小陷胸湯。合梔豉。清搗胸膈腸胃。痰溼食滯。複方圖治。服藥後。神識稍清。解燥矢一次。熱勢稍減。原方除紫雪丹。薑汁梔豉。加旋覆。川貝。硃茯神。服藥後。白瘖較前更多。發遍體。夜潮熱。欬嗽痰韌。氣促。神昏。譫語。便實。脈象滑數。舌紅糙苔圓白。溼溫伏邪。有化燥之象。急投清燥救肺湯。去麻杏阿膠。重用玄參。加鮮生地。硃茯神。銀花。鮮竹葉。全瓜蔞。知母。服藥二劑。吐出白膠痰甚多。神清。內熱減。夜間發寒熱極輕。欬差氣平。胃甦。脈緩。舌紅潤根苔黃。病已轉機。仍投清燥救肺湯。去甘草。麥冬。阿膠。加益元散。旋覆花。青蒿。鱉中。鮮生地。全瓜蔞。服一劑。熱盡。胃佳。停藥。靜養數日。强健如常。

按此婦。濕溫化瘧。被截濕遏。復因雜食雞鴨水果。釀痰。若遽投大劑寒涼。勢必白瘖遏伏。痰熱內閉。結胸。故用紫雪丹清熱開竅。佐麻黃薑汁之辛熱。陷胸之滑潤。待氣機一轉。伏濕化燥。雖見舌色紅糙。苔黃白。邪由榮分。轉出氣分。大劑清燥救肺治之。轉燥爲潤。若始畏麻黃生薑性熱。石膏性寒。繼畏玄參地冬甘膩。祗用辛涼清熱。甘淡滲濕。以謂藥性和平。則病重藥輕。恐難奏效。若謂藥性猛烈太偏。則日醫和田啓十郎曰。凡藥物。皆利用其特有之偏性。以矯正病的傾向。故不偏性。則不能爲凡物，鄒潤安曰。凡藥所以致生氣於病中。化病氣爲生氣者也。凡用藥取其稟賦之偏。以救人陰陽之偏勝也。是故藥物之性。無有不偏者。何廉臣先生曰。吾儕業醫。當遵守醫聖仲景之遺法。臨病探源。對證發藥。創所謂經驗學派。誠探本之言也。

小兒傷食(下)

尤學周

㈣傷食發熱

傷食發熱。大都由腸胃炎而起。有熱盛於午後。手足濈然汗出而不解。大便秘結。乃陽明胃實之證。有全身發熱。熱勢留戀不退。泛噁便溏而腐臭。乃腸胃發炎。有身熱而四肢厥冷。大便頻泄。乃脾陽不振。泄瀉過度所致。其熱之情勢不同。其治療之方法亦不一。

發熱之原因甚多。一見發熱。必不能遽認爲傷食之見證。必兼見食慾不振。晝夜煩啼不安。腹中作痛。舌苔厚佈。或吞酸噯腐。或便秘。或便泄。僅見一二證候。尚不能斷爲傷食。須兼見三四證候。始可決定。如發熱腹痛。多半爲食滯。若據此而即斷爲傷食。以傷食之方治之。未免致誤。如膽石症。如盲腸炎。皆腹痛而有熱度者。又如發熱而泄瀉。除傷食而外。感冒寒涼。腸癆。皆有此現象。若貿然投以傷食之方。未有不誤事者。

傷食發熱。隨症情之輕重大致可分爲三種治法。其一爲釜底抽薪。諺云。揚湯止沸。不如去火抽薪。若見熱而治熱。不去所以發熱之積滯。無異揚湯而止沸。故凡大便不通者。及便頻而不暢。腹部作痛者。皆以通導爲主。其二爲消炎解熱法。因傷食而引起腸胃發炎。因腸胃發炎。而生熱度。同時兼見泄瀉之證。蓋泄瀉原爲腸胃之一種抵抗作用。使邪從下泄。積滯隨去。其治法因釜底無薪可抽。祗須解其炎而清其熱。如川連・葛根・銀花炭・淡黃芩・炒六曲之類。爲必用之品。其三爲扶正祛邪法。泄瀉過多。腸胃之炎證未退。而腸氣已虛。四肢厥冷。須一面扶陽。一面消炎。附子與川連銀花炭等同用。小兒貪食。爲父母者。宜設法制以之。以免發生傷食之症。在病中尤宜有節。不使過多。胃腸各症。須禁食者。不可以溺愛而縱其食慾『愛之而反以害之』熱病而不節食。熱與積滯相併。無異助紂爲虐。其勢必愈甚。往往變生不測。不可救藥。噬臍興嘆。悔無及矣。(完)

小兒傷食（上）

尤周學

小兒疾病。非外感時邪。即內傷飲食。此人人所知者。食之本能。屬於天賦。小兒初生。蒙然無知。惟吮乳則不敎而能。饑餓之時。則藉啼哭以表示之。得食則啼哭始已。故食者。天性也。職是之故。食慾亦最旺。而於小兒爲尤甚。貪食之小兒。最爲習見。因貪食無厭。以致胃腸之運化。發生阻碍。誘起各種疾病者。比比然也。小兒傷食。似爲一種簡單之病症。然以余臨診之經驗。並不若理想上之簡單。有傷於胃者。有傷於腸者。有上逆而爲嘔吐者。有下注而爲泄瀉者。有停積於內。堅結而成便秘。以致胸痞腹脹者。有腐解分化。蘊釀生熱。以致煩躁不安者。此乃鈍單之傷食病。其本人原無疾病。僅因飲食不愼。造成此種證候。然已不能視爲簡單。苟與其他疾病合併。則不特證情甚爲複雜。而且危險非常。蓋夾食之病症。其熱度必高出於常例。因之譫語妄言。賊及於腦。或且發生痙厥之現象。

病中食物。固不可絕對禁止。然不當食而食。或不欲食而強之食。皆足以加增病勢。發熱之疾病。食物尤當小心。蓋食物原以增加體溫。熱病妄食。體溫愈增。其勢愈甚。且大多數之疾病。皆足以影響於消化器。阻碍其消化機能。食物入內。成爲積滯。不特無裨於病體。且助桀爲虐。無形之中。爲病勢張威而已。無知識之家長。以爲兒不食。其體必益虛。強爲進餐。以致熱勢頓進。陷入危險之境。可恨可嘆。

傷食之原因有三。㊀飲食太多㊁飲食不調㊂飲食之不適合。飲食太多。最易使腸胃受損。蓋腸胃之筋肉。雖有伸縮之能。而其消化力。則有一定限度。過其量。則其消化力不足。勢必停貯而不能運化。腸胃受其刺激。因是發生種種疾患。飲食不調。又可分爲嗜零食。及食物不時二種。小兒喜食。溺愛之家長。昧於多食之害。除正食之外。又購零食以食之。以致養成嗜零食之習慣。詎不知食物入腸。非二小時至四小時。不能完全消化。若略覺腹內空虛。並未飢餓。即食零食。使胃之筋肉伸縮無常。又無安逸休息之時。其害實非淺鮮。何況零食之小兒。其胃內未必留覺空虛者乎。在貧苦之家。或忙於職業之人。往往不得準時而食。其小兒亦因之久而不得食。或二餐連食。或無米則不食。有糧則多食。傷飢傷飽。即由於此。所謂飲食之不適合者。所食之物。不適宜於小兒之營養。及其飲食之料。其成分不當。失其平衡。即以乳汁而論。或多脂肪者。或其甜味太厚者。皆不合於小兒。食之即有弊焉。

㊁傷食嘔吐

小兒嘔吐之症。已述於前。茲所言者。乃吐嘔原因中之一種。由傷食而來者。嘔吐之發生。原爲一種防禦作用。傷於飲食。胃壁感受刺激。胃神經即傳至於腦部之嘔吐中樞。於是嘔吐以作。故嘔吐乃保持身體之端。嘔吐之前。輒先有一種不快之感覺。吾人名之曰噁心。在噁心之時。欲吐而未吐。甚形不安。可用指頭抓斡咽喉以刺激之。率性催起其嘔吐。反爲安全。

嘔吐之物。以食物後之時間久暫而異。食後立即嘔吐者。所吐爲純粹之食物。若進食後經過若干時間。則所吐者。爲略已消化之粥狀物。若進食已久而嘔吐者。所吐之物。有一種惡臭。且多混黏液。

傷食與其他嘔吐分辨之點。爲胸部作脹。腹中不舒。吞酸噯腐。嘔吐而兼見此等徵象。其爲傷食無疑。吐後如覺爽快。則病根已除。無須服藥。小兒口不能言。爽適與否。須觀察其情狀。大約吐後而興致轉佳。或安然而臥者。皆爲佳兆。如吐後仍覺不適。或尙有嘔嘔欲吐之狀。則當相證而施治。或用消導之劑。以調和其中州。或用催吐之劑。使其上逆而去。

古方治病。原有吐法。後人則見吐止吐。不辨原委。概以鎮逆之品投之。內經云。『病在上。因而越之。』故有瓜蒂散等吐法。惟用之不得法。往往僨事。故率採用和中法。『平胃散』『保和丸』『枳實導滯丸』等方。用之最爲中肯。（未完）

孕婦與便秘

懷鳳

吾人大便。宜每日排泄一次。使無宿積。則神爽快。身體亦健全。反之如大便不暢。則腹筒脹滯。精神不爽。或引起其他疾病。

二三日以上不大便。謂之便秘。有偶然便秘者。有成爲習慣。時常便秘不通者。此症之原因甚多。而出於人爲者亦占不少。常人以生活之忙碌。往往無暇顧及大便。或故意忍住。間日則便糞凝固。不易排出。隔日愈多。糞便愈結。排洩愈難。久後。將成爲習慣。

孕婦便秘之原因有二。其一。因身體運動之不足。（大多數之孕婦。恐運動有碍於胎。故多安逸少動）腸壁蠕動緩慢。以致便秘不爽。其二。直腸與子宮鄰近。受孕以後。子宮逐漸膨大。壓迫直腸。使排泄之道。爲之緊窄。大便不易排出。成爲便秘。

通常之便秘治法。率用瀉劑。患者以大便之困難。身體不舒。於是服瀉劑以通便。數日後。便又秘。再服瀉藥。其結果。必致不服瀉劑。不能通便。以後便愈秘。藥量愈增。而卒不除。此種便秘所以成爲習慣者。皆由亂服瀉劑所致。爲之治療。非一時可以奏效者。

孕姙便秘。其害較常人爲大。糞便久留體內。有毒物質。被吸收而入血液中。除引起頭痛眩暈等不快症狀而外。且將影響及於胎兒。且糞塊積滯腸內。壓迫子宮。於胎兒亦爲不利。故最好養成日日通便之習慣。否則數日一便。努力掙持。足以損傷胎氣。且有流產之患焉。

幸福書局出版醫藥新書

地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

求孕與避孕　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

腎病研究　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

百病秘方　全書二冊　實售九角　外埠函購寄費一角

保腦新書　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

胎產問題　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

小兒嘔吐

尤學周

小兒之胃。容量甚少。不宜多食。諺云。疾病從口入。小兒疾病。大半由飲食不愼所致。嘔吐爲胃疾之一。與飲食之關係甚大。故撫育小兒者。切勿誤認多食爲可喜。不食而強之食。貴在食必守時。且有節制。

哺乳之兒。嘔吐尤易如食後即吐。其味不變。多由過食所致。乳兒不知饑飽。貪食無饜。乳母之乳汁充足者。久啣乳頭。不知停止。致胃不能容。哇然作吐。此乃乳兒之疏忽。在強健活潑之小兒。一時尙不致發生影響。如身體孱弱者，食之過量。消化不及。屯積於胃。必誘起種種疾患。

乳兒之胃。未成彎形。受外面之冲激。易於作吐。如食後受寒。緊小衣服之壓迫。或抱法不安。皆能使乳汁翻出。故食後宜愼於調護。最好令其安臥。如較大之小兒。則不一定爲受外面冲激所致。又當注意其消化方面。

因消化方面所誘起之疾患。大都有嘔吐現象。嘔吐之外。兼有頭痛。眩暈。胃部疼痛。腹部脹滿。心身不快。惟小兒有口不能言。或言而不能達其意。故藉啼哭以表示其痛苦。又以其來勢之遲緩。有急性與慢性之別。急性者。忽然嘔吐。且發大熱。慢性者。雖有煩躁不安之象。或無熱。或有熱。有熱亦不甚高。大約每於乳後六時至八時。即行嘔吐。大便之中。皆含有不消化之食物。如見此證。一面當節制飲食。甚者不進飲食。使胃有休息之機。得以漸次恢復其消化力。一面用消導之劑。以利大便。去其胃腸中不潔之物。則嘔吐可除。諸證亦退。

中毒。亦能嘔吐。幼年時代易於中毒。如藥物之內用或外用之際。因藥物內所含之特異質。而發中毒證狀者有之。或因用量過多而發生者有之。在乳兒時期。因乳母之服藥。由乳汁之介紹。移傳於兒體。而間接發生者有之。稍長。因食物不愼。攝取未熟水果。及腐敗之品。因而中毒所見尤多。中毒嘔吐。原胃部機能之反射。發生抵抗作用。思將毒物驅出之徵象。此時宜酌用吐劑。扶助其抵抗作用。使禍根悉數湧盡。或用瀉劑。從下部逐出之。或用解毒之劑。以和解其毒性。咳嗽之劇者。震動胃部。胃內食物。不能安留。往往發生嘔吐。此宜先除其咳之因。以平除或減少其咳勢。則胃部不受震動。嘔吐自止。

夾陰腹痛急救法

徐相任

有姿啖冰瓜。繼以性交。有性交之後。恣啖冰瓜。而寒中少陰。少腹奇痛欲死。別無所苦者。此世俗所謂夾陰也。施以手術解剖。必死。吾見甚多。以吾國民間合理的薑糖濃湯。或艾糖濃湯。大量熱服。可以十不失一。摩登男女。此風尤甚。人人必須謹記此法。以防萬一。鴻興襪廠某君。寧波人。爲黎黃陂之傳從武官。體質絕强。而好冰淇淋。日啖八九客以爲常。夏日在北平大啖冰淇淋之後。徒然腹中奇痛。遽入協和醫院。西醫剖腹視之。一無所得。遂爲之縫合。手術未完。而痛又作。某君以拳搥牀曰。强使手術殺我矣。奄忽而死。使當時以薑糖艾糖濃湯飲之。何待於剖腹。亦何至於死耶。

家庭醫藥

活屋（十三）

（蟄庵譯）

曰汗腺。專以體內不用之惡液。排泄於體外。同時使體內之熱。勿至過高。此液名曰汗。由上記之細管。傳達於皮膚之表面者也。集此旋卷之汗腺細管。而置直引伸之。其長可達十里汗腺之數。全體達二百五十萬以上。視身體之部分。而多少有不同。於一寸平方之面積。頰上有五百餘。額上有一千二百以上。手掌之中。幾至二萬五千以上云。

由此無數汗腺。不絕排泄之汗。雖目所不見。然集一晝夜之量而測之。少至六七合。多至一升二三合。爲激烈之勞動或運動時。則不成瓦斯之形。成珠滴而流出也。

汗中之固形成分。有百之五許。因不能爲其他之水分而發散。故與留於皮膚之表面。常塞汗之出口。如此則汗之發散爲所妨害。從而鬱積於體內。再返於血液之中。遂至釀成疾病。是故清潔皮膚。爲至要之理由。昔某國人民。當國之大祭典時。以一小兒。

溼溫證治

楊舒榮

濕溫致病之因。良由濕邪踞於氣分。醞釀成溫。尚未化熱。不比寒濕之病。辛散可瘳。濕熱之病。清利乃解耳。是病之脈。脈無定體。或洪或緩。或伏或細。故難以一定之脈。印定眼目也。其證始惡寒。後但熱不寒。汗出胸脘。舌白或黃。口渴不欲多飲。此時宜分化濕熱。兼疏外邪。擬濕熱兩解法

濕熱兩解法

生茅朮一錢　黑山梔三錢　煨石膏五錢　知母錢半（鹽水炒）　茅根去心五錢　飛滑石包五錢
廣藿梗一錢半　淡竹葉卅張　省頭草二錢　淨連翹三錢　粉草五分

此方服後。熱甚無汗。脘痞身痛。欬嗽作嘔。舌苔厚膩。是濕熱交熾。太陰陽明合病。有化疹之象。宜以清解透邪法。或用清宣肺胃清。

清解透邪法

連翹殼四錢　煨石膏五錢　象貝二錢　薄荷後入錢半　茆朮一錢知母錢半同炒
大力子炒杵錢半　黑山梔三錢　大豆黃卷五錢　滑石通草包五錢　白蘆根去節五錢　粉前胡錢半

清宣肺胃法

廣玉金二錢　黑梔三錢　大貝母三錢　淨連翹四錢　雞蘇散包四錢
大力子炒杵二錢　姜川連四分　粉前胡錢半　白蔻仁研後入三分　清水豆卷五錢　苦桔梗三分　姜竹茹二錢

濕溫一症。最易變端。倘有邪陷化燥。刦津昏瘂。風動之變。可仿諸溫門中治法損益治之。

婦科雜談

葉勁秋

經水辨色

心主血。故以色紅爲正。雖不對期而色正者。易調也。

辨五色之因
- 紅——火旺。
- 淡白——氣虛火衰。
- 紫——火太旺。虛寒。
- 黑——火大旺。虛寒。

淡紅在血虛寒也。或挾痰停水以混之也。

堯封曰。色白無火。亦屬近理。然亦有不宜補火者。曾見元和一婦。經水過期十日方至。色又痰白。穩婆據此投肉桂藥數劑。經水過多。遍身發黃。不能飲食。身熱脈數。竟成危候。丹溪又謂。經水淡白。屬氣虛一證。要之臨診時。須細察脈象。遍參旁證。方識虛實寒熱。倘有疑似。證中有兩說者。當先用其輕劑。如色淡一證。先用補氣法不效。再投補火。庶無後悔。孟莫曰。色淡竟有屬熱者。古人從未道及。須以脈證互勘自得。但不可作實熱論。而瀉以苦寒也。李氏曰。色紫者。風也。熱也。葉氏曰。紫黑屬熱。在其常也。然亦有風寒外乘者。十中常見一二。宜四物加荊防姜艾。

治熱癤藥

李健頤

小兒當炎暑時。頭部多生癤瘡。大如核桃。紅熱焮腫。數天即潰。若用藥塗之。外雖見愈。而內毒未盡。不數日仍就原處復發如前。留連不愈。甚極狠狽。可用鉻銅土鍋研末。調茶油日塗四五次。數日後。即可完全收功。必不再發。此藥爲治癤神藥。請試用之。

葉勁秋醫師編著

中醫基礎學

本書爲研究醫學者必讀之書內容分生理病理診斷治療陰陽五大綱定價大洋六角特價對折祇售三角外埠寄費加一

上海三馬路雲南路幸福書局

國醫楊志一

遷移通告

本診所因診務日煩。原址（西藏路平樂里六號）不敷應用。現已遷至本埠白[illegible]隆醫院西首西祥康里九十號。照常應診。電話新號碼爲三四一七三號。

風流病請犬醫治

異想天開

病雖漸痊　獸性大發
一絲不掛　命根險斷

南海陳某。向在來往省城大阪鄉之平湖拖渡當大偈。每于工暇。即協同夥三五。在長堤一帶。問柳尋花。因此與珠娘帶金妍識。詎未及旬日。陳即患風流病。日昨。陳正在舵內。用藥水將所患之疔疳洗治。適論所畜之犬。環繞于陳之膝前。陳下部血膿淋漓。該犬即上前將血膿舐去。如是者數日。陳之疳疔。續漸告痊。不禁大喜。對於該犬。非常鍾愛。昨日。該輪由大阪拖渡來省。即停泊于洲頭嘴河面。是日晚飯後。陳在艙下將下裳除去。着該犬照常吮舐。詎該犬是日忽變常性。陳甫去下衣。犬即大發兇性。將陳之生殖器啣住。死力不放。陳痛極而號。同夥馳至。是陳在艙內。一絲不掛。下部爲犬所嚙。乃將該犬設法牽開。詎愈牽嚙之愈力。陳當時痛楚難堪。大呼救命。水警乍聆救命聲。即馳至登輪視察。協同將犬擊斃。陳始脫險。但生殖器已爲該犬嚙至重傷。請某醫生療治及敷藥後。現仍奄奄一息。呻吟不已。

冷飲爲胃痛之原因

郭人驥

自夏至秋。不論中西藥肆。胃痛者。下痢者。傷食者。交易紛紛。即胃腸素號健康之人。亦多有俄然發起胃痛者。此皆攝取飲食物方法不良之過也。試叩其飲食如何。甲曰。余於臥前。飲陰涼菉豆湯。再進麵食。乙曰。余於就寢時間。飲冰汽水後。復食牛排。丙亦於未眠之前。服冰忌淋後。並進細點。總之。不外在就寢時間。先服冰涼飲料。然後再攝取食物。爲其原因也。

夫胃腸之消化食物。必需一定之時間。在此消化之際。又必要一定之溫度。然欲攝取必須消化一定時間之食物。反先行攝取冰冷飲料以奪其消化必要之溫度。胃若不待其體溫恢復如常以前。不能發起作用。因而消化作用暫時中止。或被減弱。若是。則食物不得不空處胃中若干時間。在此期間。發起腐敗作用。其所發生之腐敗物。即所謂毒素。作用於胃壁而起胃痛。故欲謀胃之健康者。就寢之前。禁止飲食。而在一般就餐之際。切勿同時攝取過冷之飲料爲必要。余觀於近日夏令宴客之習慣。輒用冰冷汽水或冰冷啤酒以佐餐者。不禁爲之寒心。非謂此種冷飲之可廢也。蓋此等須在空腹時用之以解暑。方爲適當耳。

水腫良方

錢松柏

花生去殼。內衣。和飴糖。入磁罐內燉爛。令病人充作粥飯。三日後即可見效。（余前日自上海返舍。遇陸友博三先生。偶然談及水腫。而得斯單方。據云曾有一患此症者。遍體俱腫。臥床不起。甚至身體不能轉側。求醫束手。藥石無靈。與以斯方。服後小溲增多。而病亦爽然若失。茲以記之。投之本報。以供患之者用焉）。

信不信由你

婦人肛門亦能產子

瓊崖訊。瓊屬陵水縣牛角洲。（在崖縣極東之海中）。有舟子黎詳雲。向以航海爲業。有妻及子女。同處舟中。其妻去年懷孕。近將瓜熟蒂落。旦夕呻吟。哀聲呼痛。狀極慘怛。至分娩之日。痛益苦劇。臀骨忽然寬弛。肛門陰戶。均呈異狀。移時嬰兒從肛門產出。較常兒更爲壯碩。而產婦亦獲無恙。肛門原司洩糞。今乃居然產子。誠亘古少見之怪事也。

汗—氣—熱—遺泄之治療

蔡大璋

夫人之疾病。不外虛實寒熱四大症綱。虛則補之。實則得之。寒則溫之。熱則清之。此千古不易之定論。盡人而知者也。虛爲不及。實爲太過。寒熱爲陰陽之偏勝。治病者。要以捨其長。而補其短。務必求其均勻而後已。故醫猶匠也。量其材而修其病。豈可偏執哉。某君著有『療病大綱』一則。謂『無汗不發汗。喘氣毋耗氣。有熱莫攻熱。遺精莫濇泄』四句統括一切。惜偏於一見。專爲陰虛之人着想。未能闡明實症之治。使讀者有所缺憾。余故不揣冒昧。特爲補述。聊資點綴。設有瑕疵。希海內明眼指正。以匡不逮則幸甚焉。

(一)汗　汗者五液之一也。陰虛之人。不可發汗恐其忘精。久病形肌消爍者亦然。陰虛之人。初起感冒。存陰之中。略佐發汗。如銀翹散之類。久病形肌消灼增液即是作汗。宜復脈。增液等湯。若傷寒無汗之傷風無汗。溫病初起無汗。豈不能發汗乎。傷寒無汗。麻黃湯。傷風無汗。杏蘇飲。溫病無汗。重則梔豉湯。輕則銀翹散。吳鞠通氏云。『溫病忍汗』因溫病最善傷陰。然用之於初起之時。或可藉汗以解也。但傷寒論。尺脈細者爲裏虛。亦有禁汗條。溫病則非於初起之時。虛表症者。斷不可用也。

(二)氣　氣有宜舒宜降宜增。喘氣者。氣之有餘也。喘促者。氣之不足也。內經云。『氣盛者奪之』。定喘湯。青龍湯。治喘之因於寒者。葛根黃連黃芩湯。白虎湯。治喘之因於熱者。此二者。皆平喘耗氣之劑也。若諸氣膹鬱。亦爲氣之有餘。蘇子降氣湯。四七湯。降氣舒氣。亦即耗氣也。元氣不足。中陽虛者。宜投補中益氣。陰精不足。下元虧者。腎氣丸之類是也。

(三)熱　有陰虛而內熱者。有外感而身熱者。有陽明實熱結者。有熱結旁流者。陰虛內熱。症現頭腰痛。目澀。神志恍惚。身熱。甚則手足心熱。此熱非補其巳傷之陰精不可。誠如陳君所云。甘寒之類。如知柏地黃。復脈等湯但陰虛之人。陽明實。增液或增液承氣湯。亦即攻熱之法。其他實症。三承氣之屬。豈非攻熱之具乎。吾人要在臨證之時。各隨其症而之與可也。

(四　遺精　遺精一症。可補可濇可泄可清熱。亦隨其症狀而定。少年相火旺者。責之熱重。宜清熱。妙香散。腎熱湯之類主之。若兼小便赤痛。宜泄熱。龍胆瀉肝湯主之。若精滑脫。陽事不擧者。宜固濇。金鎖固精丸。茯兎丹之類主之。若耽於手淫。而發育不全。以及陰虧稟質不充者。宜補腎。知柏地黃。二仙膏。還少丹。斑龍丸之類主之。

治火燙驗方

石岱雲

余于六月中旬。因用火酒失愼。致身受重傷兩處。當時痛不可忍。乃以雞蛋白生大黃磨敷患處。其效如神。傷勢日見減輕。未及旬日竟巳霍然。

心汗治驗

黃虎臣

西門外方姓婦。初患溼溫。經醫治愈，忽身常多汗。而胸部尤甚。且時吃吃作驚笑。醫誤爲病後氣虛。與以止汗藥。非惟勿效。益且加劇。有介紹余往。往則切其脈。左部滑大而數。余曰。此心經有熱也。內經云。心主汗。又云。在聲爲笑。然其多汗多笑。乃心經之實證。蓋心爲壯藏。陽中之陽。心火與邪熱俱熾。則炎炎之勢。逼陰液外泄而爲汗。曦赫之化。喜神蕩而爲笑。若夫心虛者。則怔忡而無汗。憂而勿笑也。衆然余言。乃書黃連五分。生地三錢。通草八分。再加清熱降火之品。一劑而笑停汗止。再診用前方出入。覆盃而恙全失。夫醫不難於用藥。而難於識證。證之不明。藥每入誤。誌此非敢邀功。聊以自勉耳。

幸福書局代售各種良藥

地址 上海三馬路雲南路轉角

遺精敵　有夢而遺。無夢而洩。久患新起。服之如神。　每盒大洋一元

保腦丸　用腦過度。鼻流濁涕。腥臭異常。一服即愈。　每盒大洋五角

白濁丸　白濁初起。溺管刺痛。止濁定痛。效如桴鼓。　每盒大洋一元

吐血靈丹　肝火犯肺。肺絡損傷。痰紅吐血。服之立止。　每盒大洋五角

獺肝定痛散　女子善鬱。肝病時發。獺肝定痛。靈驗無比。　每盒大洋四角

小兒傷食(中)

尤學周

(二)傷食泄瀉　泄瀉與嘔吐。同爲生理上之一種抵抗作用。所以排除體內之有害物質。傷食泄瀉乃因飲食不愼。或飲食過多而致者。其所以造成泄瀉之原因有三。㊀飲食過多。胃不能容。驅之於腸。腸仍不能容。驅之外出。即成泄瀉。㊁飲食過多。以致運化不及。初則停滯於中。繼則腐解而下。成爲泄瀉。㊂食不潔及生冷之物。傷其胃腸。泄瀉乃作。

傷食泄瀉。大多秉見腹痛。第㊀之徵候除腹痛而外。必復發吐酸噯腐。第㊁之徵候。除腹痛而外。必先見便秘。大便數日不下。繼而復轉泄瀉。第㊂之徵候。其痛也綿綿而作。所下之物。不若㊀㊁兩證之穢臭。有時作稠黏狀。與痢疾無異。

常人一見泄瀉。不問原委。亂投藥餌。如十滴水。鴉片烟泡等。强爲止澀。以糞速效。不知傷食泄瀉。宜因勢利導。將不良之物。盡行排出體外。方能奏全。經所謂『通因通用』也。若用藥澀住。積滯不得去路。醞釀成熱。其害更大。

治傷食泄瀉之法。以消導爲主。枳實•檳榔•陳皮•炒六曲•穀芽•雞內金•萊菔子•查炭。可以隨證參用。甚者可用大黃元明粉以蕩滌之。

小兒體質孱弱。所食不多。又往往發生泄瀉者。乃脾虛不能運化所致。其所食之物。雖不過多。然巳超過其本人之量。亦傷食之一種。惟此種傷食泄瀉。以健脾爲主。白朮。扁豆•山藥。炙內金•穀芽•陳皮•枳殼。甚則加補骨脂。春砂仁。黑附塊等。

(三)傷食腹痛　傷食者。多見腹痛。而腹痛未必即爲傷食。蓋痛乃疾病之一種警告。所以表示其苦楚。而促起人之注意也。人身各處。如皮膚。肌肉。與被覆內臟之胸膜腹膜。以及骨表面之骨膜等。皆有司痛之神經。佈於其上。神經之末稍。感受刺激。大腦中樞。接受刺激以後。即生一特別之不快之感。即爲疼痛。此與警鈴之設施。有同一之作用。

腹痛之原因甚多。凡一切腹內臟器疾患。大多均有腹痛症狀。然疼痛大有區別。部位亦各不同。苟不明其痛之所由來。而亂投藥餌。欲求病之治愈。安可得乎。

傷食腹痛。因飲食不愼。腸胃受其刺激。以致粘膜發炎。疼痛以起。其證狀大致可分便通與便秘二種。

傷食腹痛而便通者。食不潔之物。或飲食過多。以致腸胃發炎。蠕動加增。故疼痛而大便頻下。便下之物。或如稀水。或如粘涕。大都身熱脈數。其便秘者。不一定發熱。而腹部則必作脹而痛。

便秘之原因甚多。有由於習慣者。有由於腸部之疾患者。有由腸部以外臟器之疾患影響所致者。(其詳當另行述之)其證除腹痛而外。腑氣不行。多屁。腹部堅。按之愈痛。

乳兒腹痛。口不能道。惟藉啼哭以表示其苦況。哭時。其聲甚高。面壘流淚。雙腿屈曲。兩拳緊握。較大之小兒。或按手於患處。以表示其痛苦之部位。

傷食腹痛而秉泄瀉者。內滯未清。乃『協熱利』。不可用止澀之劑。仍宜導滯。腹痛而下黏膩物。有裏急後重之勢者。宜重用枳實檳榔。甚則可加大黃。腹痛便秘。按之愈痛。宜用下法攻之。如服下劑。便意頻頻。腹痛愈甚。而卒不得下者。有燥糞結於肛門。堅持不下。宜蜜煎導法。或灌腸亦可。

肺癆貧血

肺癆病人貧血。爲營養障碍的結果。營養障碍却由於潮熱。因潮熱而使身體肌肉消耗。而使消化力薄弱。所以貧血和消瘦。間接都由潮熱而起。貧血的症狀爲缺少血液。如皮色蒼白。肩及眼臉膜灰白、頭眩、耳鳴、四肢末端麻冷等。爲其著要的自覺症狀。倘檢驗血液成分。大抵在初期呈萎黃病性變態。即病人血液內紅色素的比數較少。這種現狀。凡少男少女患肺癆病的。很多發現萎黃病狀的貧血。病者臉色灰黃。而者頭眩耳鳴等症。反不甚顯著。至於在肺癆晚期。肺內空洞巳成。潮熱趨勢甚熾。那時病者血液。每可發現白血球的大量增多。

貧血和肺癆的關係。較之其他合併症象爲重要。吾們臨診上可得爲注意的關係。約擧之有下述幾點。㊀貧血症的症狀。有時頗與肺癆初期症狀仿彿。記者近年來過到很多青年男女。他們家長因偪於肺癆的可怕。在一二種相似病狀之下。便競競然以爲是成了癆了。又聽信一二旁人之言。更是終日孜孜於治癆的方法。但一經仔細診查。則確爲貧血現象。而無法能證明是患肺癆結核。此種疾病。倘能從補血一端治療。在短時期內。可奏奇效。反之若僅僅於肺癆入手。雖肺癆一般療法。亦爲注意於營養日光。然終覺有隔搔癢之憾。

在貧血和初期肺癆最易混淆疑似的病象。是潮熱與營養障礙二項。因爲患貧血的人。亦能如肺癆一般地在午後體溫昇高。有時甚輕。有時可高至華氏一○二度。不過貧血的熱。不若肺癆之有規則。即並不每日下午有熱。昇高度數之相差點。比較肺癆的潮熱爲著。其次爲營養障碍。當然貧血病人的食慾。必亦減遠。但據作者經驗。肺癆病人的食慾。往往較貧血病人尤爲減退。以上所述。假如肺癆病人秉有重度貧血。那就當以肺癆之症狀爲準了。